

## **ВЫПИСКА**

**Больной (ФИО) Быковский Святослав Алексеевич Дата рождения: 06.12.2010г.**

**Находился на амбулаторном лечении с 09.05.2016г. По 27.05.2016г.**

**С диагнозом: Последствия перинатальной патологии ЦНС. Синдром внутричерепной гипертензии. Задержка психо-речевого развития с аутистическими проявлениями. СДВГ.**

***При электропунктурном обследовании выявлены следующие функциональные изменения:***

- *Нарушение ликвородинамики с сочетанным снижением адсорбции ликвора и его гиперпродукцией.*
- *Умеренно выраженная симпатикотония, с возбуждением ЦНС.*
- *Остаточные явления перинатальной гипоксии коры головного мозга.*
- *Дисфункция стволовых структур головного мозга и мозжечка.*
- *Снижение функциональной активности лобных долей, речевых центров коры головного мозга.*
- *Дистония сосудов головного мозга.*
- *Умеренная дисфункция шейных сегментов спинного мозга.*

**Направленность программы лечения.**

- Стабилизация ликвородинамики.
- Седативное рефлекторное воздействие на ЦНС ( для снижения проявлений возбудимости
- Стабилизация функциональной активности шейных сегментов спинного мозга.
- Стабилизация функциональной активности стволовых структур и мозжечка.
- Рефлекторная стимуляция лобных долей ( для повышения познавательной активности, концентрации внимания, памяти, логического мышления, психологического возраста, социальной адаптации ).
- Рефлекторная стимуляция функциональной активности корковых речевых центров ( Брокка — для улучшения дикции, набора словарного запаса, согласования слогов в словах; Вернике — для внимания, понимания, запоминания обращенной речи, Ассоциативных зон для формирования фразовой речи, зон обучения.
- Нормализация сосудов головного мозга.

**Проведено курс микротоковой рефлексотерапии с применением прибора « МЭКС » ( 15 сеансов ), логопедический массаж. Занятия с психологом. Массаж шейно-грудного отдела, кистей рук.**


**В результате проведенного лечения:** Стабилизируется ликвородинамика. Стал более послушным, более усидчивым. Улучшилась концентрация внимания. Растет познавательный интерес. Повысилось понимание обращенной речи. Расширяется звукоподражание, появляются слоги, простые слова. Активнее занимается со специалистами.

**Рекомендации:**

- Повторный курс электрорефлексотерапии через 3-4 мес.
- Лецитин по 1 ч.л. 2 раза в день, - 1,5 месяца.
- Мексидол по 1 мл 1 раз в день, в\м, № 10. Затем пить мексидол по 1\2 табл. 2 раза в день, утро, обед. - 1,5 мес.
- Пустырник форте. По 1\2 табл. 2 раза в день. - 1,5 мес.
- Перерыв 2 недели.

- Глиатилин по 1 кап. 1 раз в день, № 42
- Дибазол по 0,003 г на глюконате кальция, № 30. Пить по 1 порошку 1 раз в день, через 2 часа после еды.
- Комбилипен по 1\4 табл. 2 раза в день.- 1,5 мес.
- Занятия с логопедом-дефектологом .
- Отвар полевого хвоща 2\3 взрослой дозы в день, 2 дня в неделю ( среда, суббота ). При перемене погоды, весь период.
- Пополнять словарный запас ребенка, разговаривая с ним медленно, четко называя предметы.

Зав. отделением  
Курепина М.И.



**Методические Рекомендации Министерства здравоохранения РФ  
№ 99-01-001135/ 10.03.2005**